

Gebrauchsinformation

Pasta Zinci oxidati mollis SR

30 %ige Paste zur Anwendung auf der Haut

Dermatikum

Wirkstoff: Zinkoxid

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protektiv und sekretbindend bei akuten und subkutanen Dermatosen (Hautkrankheiten).

Gegenanzeigen

Pasta Zinci oxidati mollis SR darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Zink, Wollwachsalkohole, Erdnuss, Soja oder anderen Bestandteilen der Paste sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Großflächige Anwendung auf Hautarealen von mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche vermeiden. Nicht mit Augen oder Schleimhaut in Berührung bringen.

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, können Sie Pasta Zinci oxidati mollis SR bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Doch sollte eine großflächige Anwendung, insbesondere an der Brust bei stillenden Frauen, vermieden werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxid-haltige Rückstände von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da die Wirkung anderer Dermatika beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Mehrmals täglich, bei Säuglingen zu jedem Windelwechsel, auf die betroffenen Hautstellen auftragen und gegebenenfalls mit Mull abdecken.

Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt.

Überdosierung und Anwendungsfehler

Besonders im Kindesalter sind bei versehentlicher Einnahme Übelkeit, Erbrechen, Gastritis und Fieber möglich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Gelegentlich (1-10 von 1000) Hautrötungen. Bei Überempfindlichkeit gegen Wollwachsalkohole können Rötungen und Hautentzündungen (Ekzem) auftreten.

Nach Auftragen von Pasta Zinci oxidati mollis SR auf stark entzündliche Hautstellen kann ein leichtes Brennen auftreten.

Erdnussöl kann selten (1-10 von 10 000) schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat soll nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stets im Originalbehältnis und nicht über 25 °C aufbewahren!

Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung

100 g Suspension enthalten:

Wirkstoff: Zinkoxid 30,0 g

Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaseline, Erdnussöl, Sorbitantrioleat GOT, Wollwachsalkohole

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 50 g (N1), 100 g (N2) oder 200 g (N3) Paste zur Anwendung auf der Haut.

Pharmaz. Unternehmer/Hersteller

Pharmachem GmbH & Co. KG

Naßäckerstraße 37-39

07381 Pößneck/Thüringen

Tel.: 036738 / 659272

Fax: 036738 / 659274

Stand der Information

Dezember 2014

50 g (N1)

<100 g (N2)>

<200 g (N3)>

Ch.-B.: <>

Verwendbar bis: <>

Apothekenpflichtig!

Zul.-Nr.: 3004453.00.00

<PZN>