

Ozempic® 0,5 mg in der N3 Packung im etwas längeren Pen

Der Pen entspricht jetzt der Größe des 1 mg Pen.
Mit der Anpassung wird die Flexibilität in der Produktion weiter erhöht.

Neue Länge – neue PZN:



BISHER

Packungsgröße
N3 – 3 Fertigpens

PZN
15398540

Ab 15. Juni 2025:



JETZT

Packungsgröße
N3 – 3 Fertigpens

Neue PZN
19810440



Nur im etwas
längeren Pen
(Größe wie 1 mg Pen)



Der Pen beinhaltet
wie bisher
4 Injektionen.



Die Kosten bleiben
unverändert.

Ozempic® Fertigpens werden mit NovoFine® Plus 4 mm Einwegnadeln geliefert.

Jeweils inklusive: NovoFine® Plus Injektionsnadeln

NovoFine® Plus 32G 4 mm ist die dünnste Nadel von Novo Nordisk, die für die s. c. Injektion mit einem GLP-1 Rezeptoragonisten 1x pro Woche zur Verfügung steht. **N1** für 4 Wochen Therapie, **N3** für 12 Wochen Therapie

Ozempic® ist in 3 einfach zu verwendenden Pens erhältlich

Starten →

0,25 mg Dosis

Woche 1–4



Steigern →

0,5 mg Dosis

nach Woche 4 als
Erhaltungsdosis oder für
mindestens 4 Wochen



Optimieren →

1 mg Dosis

nach Woche 8 für
stärkere Wirkung



Deshalb GLP-1 RA.
Deshalb Ozempic®.

Erfahren sie mehr!



Ozempic® 0,25 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 0,5 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 1 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 2 mg Injektionslösung im Fertigpen. Wirkstoff: Semaglutid. **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,25/0,5/1/2 mg Semaglutid. Analogon zu humanem Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in *Saccharomyces cerevisiae* Zellen. **Sonstige Bestandteile:** Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Propylenglycol, Phenol, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität. Als Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikationen ungeeignet ist. Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle, kardiovaskuläre und renale Ereignisse, sowie untersuchte Populationen, siehe Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1 der Fachinformation. **Art der Anwendung:** Zur subkutanen Injektion in das Abdomen, den Oberschenkel oder den Oberarm. Ozempic® darf nicht intravenös oder intramuskulär angewendet werden. Einmal wöchentlich zu einem beliebigen Zeitpunkt zu oder unabhängig von den Mahlzeiten. Tag der wöchentlichen Anwendung kann bei Bedarf gewechselt werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Semaglutid oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Den Pen nicht mit aufgeschraubter Nadel aufbewahren. Darf nur von einer Person verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Übelkeit, Durchfall, Hypoglykämie (bei gleichzeitiger Anwendung mit Sulfonylharnstoff oder Insulin). Häufig: Erbrechen, Hypoglykämie (bei gleichzeitiger Anwendung mit oralen Antidiabetika außer Sulfonylharnstoff oder Insulin), Verdauungsstörung, Magenschleimhautentzündung („Gastritis“), Sodbrennen („gastroösophageale Refluxkrankheit“ (GERD)), Magenschmerzen, aufgeblähter Bauch, Verstopfung, Aufstoßen, Gallensteine, Schwindel, Müdigkeit, Gewichtsverlust, geringerer Appetit, Blähungen (Flatulenz), Erhöhung von Pankreasenzymen (wie Lipase und Amylase). Gelegentlich: Änderungen des Geschmacksempfindens, schneller Puls, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Ausschlag, Hautreizung), allergische Reaktionen (z. B. Hautausschlag, Jucken), Verzögerung der Magenentleerung. Schwerwiegend: Komplikationen bei diabetischer Retinopathie (häufig), akute Pancreatitis (gelegentlich), anaphylaktische Reaktionen (selten), Angioödem (selten), Darmverschluss (Häufigkeit nicht bekannt). **Verschreibungspflichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Dänemark. Stand:** Dezember 2024

Ozempic® und NovoFine® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark.



1x pro Woche
OZEMPIC®
Semaglutid Injektion