

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

apolind® Wundbalsam mit Nystatin Ölige Suspension zur Anwendung auf der Haut

1 g Suspension enthält als Wirkstoffe:
Nystatin 70 000 I.E., Zinkoxid 0,492 g.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** beachten?
3. Wie ist **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist apolind® Wundbalsam mit Nystatin und wofür wird es angewendet?

apolind® Wundbalsam mit Nystatin ist ein Antimykotikum/Dermatikum und wird zur Behandlung von Nystatin-empfindlichen Hefeinfektionen bei entzündlichen, ekzematösen Hautveränderungen, insbesondere Windeldermatitis, Wundsein im Bereich von Hautfalten und am Darmausgang, bei Hefepilzkrankungen im Bereich der Zwischenfinger, bzw. Zwischenzehen angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von apolind® Wundbalsam mit Nystatin beachten?

apolind® Wundbalsam mit Nystatin darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Zinkoxid, Nystatin, Erdnuss oder Soja oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittel sind.

Keine großflächige Anwendung (über 20% der Körperoberfläche).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** anwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** ist erforderlich

- Kinder: siehe Abschnitt 2. „Kinder und Jugendliche“ Erdnussöl kann in seltenen Fällen örtlich begrenzte Hautreaktionen (Kontaktdermatitis) hervorrufen.
- Schwangerschaft und Stillzeit: siehe Abschnitt 2. „Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit“

Kinder und Jugendliche

Aufgrund der hohen Osmolarität von Nystatin wird von einer Anwendung bei sehr untergewichtigen und unreifen Frühgeborenen abgeraten.

Anwendung von apolind® Wundbalsam mit Nystatin mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Zinkoxid kann die Wirkung anderer Dermatika einschränken.

Zinkoxidhaltige Rückstände sollten von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernt werden.

Anwendung von apolind® Wundbalsam mit Nystatin mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Es liegen keine hinreichenden Daten zur Verwendung von **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** in der Schwangerschaft vor.

apolind® Wundbalsam mit Nystatin soll in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden. Eine großflächige Anwendung von **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** und eine Anwendung an der stillenden Brust soll vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Die Anwendung von **apolind® Wundbalsam mit Nystatin** hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

apolind® Wundbalsam mit Nystatin enthält Erdnussöl.

3. Wie ist apolind® Wundbalsam mit Nystatin anwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

1- bis 3-mal täglich auf die erkrankten Hautpartien auftragen. In schweren Fällen kann eine häufigere Anwendung zweckmäßig sein.

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Wenn Sie eine größere Menge von apolind® Wundbalsam mit Nystatin angewendet haben, als Sie sollten

Was ist zu tun, wenn apolind® Wundbalsam mit Nystatin versehentlich eingenommen wurde?

Vergiftungen sind bei versehentlicher Einnahme nicht zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden nebenstehende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

| | |
|----------------------|--|
| <i>Sehr häufig</i> | kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen |
| <i>Häufig</i> | kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen |
| <i>Gelegentlich</i> | kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen |
| <i>Selten</i> | kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen |
| <i>Sehr selten</i> | kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen |
| <i>Nicht bekannt</i> | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

Selten:

In seltenen Fällen kann es zum Auftreten von Überempfindlichkeiten oder allergischen Reaktionen gegenüber Bestandteilen kommen. Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 Abt. Pharmakovigilanz
 Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
 D-53175 Bonn
 Website: <http://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist apolind® Wundbalsam mit Nystatin aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar.

Aufbewahrungshinweise

Vor Licht geschützt aufbewahren. Stets im Originalbehältnis und nicht über 25 °C aufbewahren!

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was apolind® Wundbalsam mit Nystatin enthält

- Die Wirkstoffe sind: Nystatin und Zinkoxid
- 1 g Suspension enthält als Wirkstoffe: Nystatin 70 000 I.E., Zinkoxid 0,492 g.
- Der sonstige Bestandteil ist: Erdnussöl

Wie apolind® Wundbalsam mit Nystatin aussieht und Inhalt der Packung

Ölige Suspension zur Anwendung auf der Haut.

apolind® Wundbalsam mit Nystatin ist in Originalpackungen mit 50 g und 100 g Suspension erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutisches Kontroll- und Herstellungslabor GmbH
Daniel-Vorländer-Str. 2
06120 Halle/S.
Telefon: 0345 29978-0
Fax: 0345 29978-19
E-Mail: info@apomix.de

Internet: www.apomix.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2015.