

### dystoLoges® Tabletten

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss dystoLoges® Tabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 6 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind dystoLoges® Tabletten und wofür werden sie eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von dystoLoges® Tabletten beachten?
3. Wie sind dystoLoges® Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind dystoLoges® Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind dystoLoges® Tabletten und wofür werden sie eingenommen?

Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Störungen.

##### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von dystoLoges® Tabletten beachten?

**dystoLoges® Tabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

##### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

###### Kinder

Geben Sie dystoLoges® Tabletten Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

##### Einnahme von dystoLoges® Tabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Infor-

mieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

##### Einnahme von dystoLoges® Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

###### Allgemeiner Hinweis

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

##### Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung des Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

##### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

##### dystoLoges® Tabletten enthalten Lactose

Bitte nehmen Sie dystoLoges® Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

##### Allgemeiner Hinweis

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

# dystoLoges®

## Tabletten

### 3. Wie sind dystoLoges® Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die empfohlene Dosis:

| Alter                                   | Einzeldosis | Tagesgesamt-dosis |
|---|-------------|-------------------|
| Schulkinder von 6 - 11 Jahren           | 1 Tablette  | 2 Tabletten       |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 1 Tablette  | 3 Tabletten       |

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendungen zu reduzieren.

#### Art der Anwendung

Die dystoLoges® Tabletten vor den Mahlzeiten langsam im Mund zergehen lassen.

#### Hinweis:

Bei besonders empfindlichen Personen und ausgeprägten Hypotonikern (Patienten mit niedrigem Blutdruck) kann eine niedrigere Dosis geraten sein.

#### Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge dystoLoges® Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Bei der Einnahme größerer Mengen Milchzucker (Lactose) haltiger Arzneimittel, wie dystoLoges® Tabletten, kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### Wenn Sie die Einnahme von dystoLoges® Tabletten vergessen haben

Sollten Sie eine Einnahme vergessen haben, können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr

Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### 5. Wie sind dystoLoges® Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was dystoLoges® Tabletten enthalten

##### Die Wirkstoffe sind:

|   |         |
|---|---------|
| In 1 Tablette sind verarbeitet:         |         |
| Passiflora incarnata Ø                  | 13,0 mg |
| Gelsemium Trit. D4                      | 39,0 mg |
| Reserpinum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6) | 31,2 mg |
| Coffea Trit. D6                         | 33,3 mg |
| Veratrum Trit. D6                       | 33,3 mg |

##### Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose, Magnesiumstearat [pflanzlich], Maisstärke

#### Wie dystoLoges® Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

Packungen mit 50, 100 und 260 weißen bis beigefarbenen Tabletten

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. Loges + Co. GmbH  
Schützenstraße 5  
21423 Winsen (Luhe)  
Telefon: 04171 707-0  
Telefax: 04171 707-125  
E-Mail: [info@loges.de](mailto:info@loges.de)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2019.