

DIE ZINKVERSORGUNG, DIE ZU MIR PASST:




1. MAGENSAFTRESISTENZ

Dank des speziellen Tablettenüberzugs passieren **Zinkorotat-POS®**-Tabletten den Magen unbeschädigt. Die empfindliche Magenschleimhaut bleibt somit geschützt. Das Zink wird erst im Dünndarm freigesetzt und hier optimal vom Körper aufgenommen.




2. NÜCHTERNE EINNAHME

Eine zeitliche Trennung von ca. 30 Minuten zwischen der Einnahme von Zink und den Mahlzeiten verbessert die Zinkaufnahme im Körper entscheidend. Insbesondere wird so auch eine Hemmung der Zinkaufnahme durch in der Nahrung enthaltene Phytate vermieden.



3. MEHRFACHDOSIERUNG

Eine tägliche Mehrfachdosierung von Zink führt aufgrund homöostatischer Regelmechanismen zu einer physiologischeren Aufnahme von Zink. Durch Kopplung an die natürliche Orotsäure in **Zinkorotat-POS®** wird das Zink gleichmäßig vom Körper aufgenommen.



ZINKOROTAT-POS®	PZN	LAGERHINWEIS
20 magensaftresistente Tabletten	06340889	nicht über 25°C lagern
50 magensaftresistente Tabletten	06340895	nicht über 25°C lagern
100 magensaftresistente Tabletten	06340903	nicht über 25°C lagern

¹ Infolge ernährungsmäßig nicht behebbarer, zinkmangelbedingter Schwächung des Immunsystems. **Zinkorotat-POS® 40 mg, magensaftresistente Tablette.**
Wirkstoff: Zinkorotat x 2 H₂O. **Zusammensetzung:** 1 magensaftresistente Tablette enthält 40 mg Zinkorotat x 2 H₂O (entspricht 6,3 mg Zink), Dextrose-Maltose-Saccharid-Gemisch (92:3,5:4,5); Maisstärke; Mannitol (Ph.Eur.); Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat; Mikr. Cellulose; Copovidon; Crospovidon; Magnesiumstearat (Ph.Eur.); Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.); Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1)-Dispersion 30 % (Ph.Eur.); Talkum; Triethylcitrat. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Zinkmangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben werden können. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile der Präparate. **Nebenwirkungen:** Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Sehr selten: Magenbeschwerden, Durchfall. Erkrankungen des Immunsystems: Sehr selten: Allergische Reaktionen. **Zinkorotat-POS®** kann bei langfristiger Einnahme Kupfermangel verursachen. **Stand:** 06/2020

