

EINFACHE ANWENDUNG

von Yselty® für eine angepasste Myom-Therapie



- 200 mg Yselty®/Tag, für maximal 6 Monate, zur schnellen Reduktion der Hypermenorrhoe² und/oder Reduzierung des Myomvolumens.³
- Nach 3–6 Monaten unter 200 mg Yselty® erfolgt eine Anpassung auf 100 mg Yselty®/Tag.⁵
- 200 mg Yselty®/Tag können optional auch zusammen mit einer hormonellen ABT gegeben werden.⁵

	Menge	PZN-Nummer		Menge	PZN-Nummer
Yselty® 100 mg	28 Stück	18105892	Yselty® 200 mg	28 Stück	18105900
Yselty® 100 mg	84 Stück	18105917	Yselty® 200 mg	84 Stück	18105923

ABT: Add-back Therapie; UAW: Unerwünschte Arzneimittelwirkung
2. Donnez J et al, Fertility and Sterility (2025), doi: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2024.12.031>. 3. Donnez J et al, Lancet 2022; 400: 896–907.
5. Römer T et al, Frauenarzt 12/2024, 896-899.

Yselty 100 mg Filmtabletten/Yselty 200 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Linzagolix (als Cholin Salz). **Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enth. 100 mg oder 200 mg Linzagolix. **Sonst. Bestandt.:** Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Macrogol-Poly(vinylalkohol)-Pflropfcopolymer (E1209), Talkum (E553b), Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172). **Anwendungsgebiete:** Bei erwachsenen Frauen im gebärfähigen Alter zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Symptome v. Uterusmyomen. Zur symptom. Behndl. d. Endometriose b. Frauen, deren Endometriose zuvor medizinisch oder chirurgisch behandelt wurde. **Gegenanzeigen:** Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandteile; Schwangerschaft od. Stillzeit; bekannte Osteoporose; Genitalblutungen unbekannter Ätiologie; bei gleichzeit. Gabe v. Add-Back-Therapie (ABT) sind die Gegenanzeigen im Zusammenhang mit ABT zu beachten. **Nebenwirkungen:** *Sehr häufig:* Hitzewallung; *Häufig:* Gemütsstörungen, wie Stimmungsschwünge, Affektlabilität (d. h. schnelle Veränderungen der Emotionen), Angst, Depression, Reizbarkeit, emotionale Störungen; übermäßige, unregelmäßige oder länger anhaltende Blutungen aus der Gebärmutter (Uterusblutungen); vulvovaginale Trockenheit; Beckenschmerzen; Arthralgie; Kopfschmerzen; Verringerung d. Knochenmineraldichte od. Knochenstärke; erh. Leberenzymwerte i. Blut; Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchschmerzen; Obstipation; Libido vermindert; Asthenie; Hyperhidrose; Nachtschweiß *Gelegentlich:* Hypertonie. **Warnhinweise:** enth. Lactose. Packungsbeilage beachten. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irland. **Stand:** 11/2024. **Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Yselty die Fachinformation!**

