

Sumatriptan HEXAL® bei Migräne 50 mg Tabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren

Sumatriptan


Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach der Einnahme nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Sumatriptan HEXAL bei Migräne und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne beachten?
3. Wie ist Sumatriptan HEXAL bei Migräne einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sumatriptan HEXAL bei Migräne aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



1 Was ist Sumatriptan HEXAL bei Migräne und wofür wird es angewendet?

Sumatriptan HEXAL bei Migräne Tabletten werden oral eingenommen und enthalten Sumatriptan, das zur Arzneimittelgruppe der sogenannten Triptane gehört (ebenfalls bekannt als 5-HT₁-Rezeptoragonisten).

Sumatriptan HEXAL bei Migräne Tabletten werden zur akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit und ohne Aura, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, eingenommen.

Migränesymptome können durch die vorübergehende Erweiterung der Blutgefäße im Kopf verursacht werden. Man nimmt an, dass Sumatriptan HEXAL bei Migräne Tabletten diese Erweiterung der Blutgefäße vermindern. Das hilft dabei, dass die Kopfschmerzen vergehen und andere Symptome des Migräneanfalls gelindert werden, wie z. B. Übelkeit oder Erbrechen sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit.

2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne beachten?

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch gegen Sumatriptan oder einen in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie Probleme mit dem Herz haben, wie z. B. Verengung der Herzkranzgefäße (ischämische Herzkrankheit) oder Brustschmerzen (Angina pectoris), oder wenn Sie bereits einen Herzinfarkt hatten
- wenn Sie Durchblutungsstörungen in Ihren Beinen haben, die krampfartige Schmerzen beim Gehen verursachen (periphere Gefäßkrankung)
- wenn Sie einen Schlaganfall hatten oder vorübergehende Zustände von Minderdurchblutung im Gehirn (auch vorübergehende ischämische Attacke genannt)
- wenn Sie hohen Blutdruck haben. Sie können Sumatriptan HEXAL bei Migräne möglicherweise einnehmen, wenn Ihr Blutdruck leicht erhöht und gut eingestellt ist.
- wenn Sie eine schwere Lebererkrankung haben
- zusammen mit anderen Migräne-Medikamenten, einschließlich solcher, die Ergotamin enthalten, oder vergleichbarer Medikamente wie Methysergide oder einem anderen Triptan/5-HT₁-Rezeptoragonisten (Medikamente, die ebenfalls zur Behandlung von Migräne verwendet werden).
- wenn Sie bestimmte Antidepressiva, sogenannte MAO-Hemmer (Monoaminoxidase-Hemmer), einnehmen oder bis vor 2 Wochen eingenommen haben.

Wenn eine dieser Gegenanzeigen auf Sie zutrifft: Informieren Sie Ihren Arzt und nehmen Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne Tabletten nicht ein.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne einnehmen.

Wenn Sie bestimmte Risikofaktoren haben:

- wenn Sie ein starker Raucher sind oder wenn Sie sich einer Nikotinersatztherapie unterziehen und besonders
- wenn Sie ein Mann über 40 Jahre sind oder
- wenn Sie eine Frau in oder nach den Wechseljahren (Menopause) sind.

In sehr seltenen Fällen sind bei Patienten nach der Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne schwerwiegende Herzprobleme aufgetreten, ohne dass es vorher Anzeichen für eine Herzkrankung gab.

Wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, könnte das bedeuten, dass Sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Herzkrankung haben, daher:

Informieren Sie Ihren Arzt, damit Ihre Herzfunktion überprüft werden kann, bevor Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne einnehmen.

Wenn Sie in der Vergangenheit unter Krampfanfällen (epileptischen Anfällen) litten oder bei Ihnen Risikofaktoren vorliegen, die die Gefahr von Krampfanfällen erhöhen, zum Beispiel eine Kopfverletzung oder Alkoholabhängigkeit:

Informieren Sie Ihren Arzt, damit er Sie genauer überwachen kann.

Wenn Sie eine Leber- oder Nierenerkrankung haben:

Informieren Sie Ihren Arzt, damit er Sie genauer überwachen kann.

Wenn Sie allergisch gegen sogenannte Sulfonamid-Antibiotika sind

Wenn dies der Fall ist, könnten Sie ebenfalls allergisch gegen Sumatriptan HEXAL bei Migräne sein. Falls Sie wissen, dass Sie allergisch gegen ein Antibiotikum sind, aber nicht wissen, ob es sich um ein Sulfonamid handelt:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne einnehmen.

Wenn Sie Medikamente gegen Depressionen, sogenannte SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) oder SNRI (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer), einnehmen:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne einnehmen.

Siehe auch „Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne zusammen mit anderen Arzneimitteln“ weiter unten.

Wenn Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne häufig einnehmen

Eine zu häufige Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne kann Ihre Kopfschmerzen verschlimmern.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn dies auf Sie zutrifft.

Er wird Ihnen möglicherweise das Absetzen von Sumatriptan HEXAL bei Migräne empfehlen.

Wenn Sie nach der Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne Schmerzen oder Engegefühl im Brustkorb fühlen

Diese Effekte können intensiv sein, gehen aber üblicherweise bald wieder vorbei:

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf. In Abschnitt 4 dieser Packungsbeilage finden Sie mehr Informationen zu diesen möglichen Nebenwirkungen.

Einnahmen von Sumatriptan HEXAL bei Migräne zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel eingenommen/verwendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Dies schließt auch pflanzliche oder nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel mit ein.

Manche Arzneimittel dürfen nicht zusammen mit Sumatriptan HEXAL bei Migräne eingenommen werden und andere können unerwünschte Wirkungen verursachen, wenn sie zusammen werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne eingenommen.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne darf nicht mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden.

Anwendungshinweis zur Teilung der Tabletten

Nehmen Sie die Tablette, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, in beide Hände. Durch Daumendruck über die beiden Zeigefinger wird die Tablette in 2 gleiche Hälften geteilt.



Wenn die erste Tablette keine Wirkung zeigt

Wenden Sie keine zweite Tablette und auch keine andere Sumatriptan-Zubereitung für dieselbe Migräneattacke an.

Wenn Ihnen Sumatriptan HEXAL bei Migräne keinerlei Linderung verschafft: **Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.**

Wenn Sie unter leicht bis mäßig eingeschränkter Leberfunktion leiden

Bei Patienten mit leicht bis mäßig eingeschränkter Leberfunktion sollten Dosen von 25-50 mg in Betracht gezogen werden. Befolgen Sie bitte den Rat Ihres Arztes.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

Wenn Sie eine größere Menge Sumatriptan HEXAL bei Migräne eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme von zu viel Sumatriptan HEXAL bei Migräne kann Sie krank machen.

Wenn Sie mehr als 300 mg Sumatriptan innerhalb von 24 Stunden eingenommen haben: **Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.**

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Einige Symptome können durch die Migräne selbst verursacht sein.

Allergische Reaktionen: Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Die folgenden Nebenwirkungen sind aufgetreten, aber die genaue Häufigkeit ihres Auftretens ist nicht bekannt.

- Zeichen einer Allergie können sein: Hautausschlag, Nesselsucht (juckender Ausschlag), pfeifende Atemgeräusche, geschwollene Augenlider, Gesicht oder Lippen, Kreislaufzusammenbruch.

Wenn Sie eines dieser Symptome kurz nach der Einnahme von Sumatriptan HEXAL bei Migräne bemerken:

Nehmen Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne nicht mehr ein. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Schmerzen, Schwellgefühl, Druckgefühl, Enge oder Schmerzen in der Brust, im Hals oder in anderen Körperteilen, ungewöhnliche Empfindungen oder Sinnesindrücke wie Taubheitsgefühl, Kribbeln, Hitze- oder Kältegefühl. Diese Symptome können intensiv sein, gehen aber im Allgemeinen schnell vorüber.

Wenn diese Symptome andauern oder schlimmer werden (besonders die Brustschmerzen):

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Bei sehr wenigen Patienten können diese Symptome durch einen Herzinfarkt verursacht sein.

Weitere häufige Nebenwirkungen

- Übelkeit oder Erbrechen, dies kann jedoch durch die Migräneattacke selbst ausgelöst werden

- Müdigkeit oder Benommenheit

- Schwindel, sich schwach fühlen, Hitzewallungen/Gesichtsrötung

- vorübergehender Blutdruckanstieg

- Kurzatmigkeit

- schmerzende Muskeln

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

- Veränderungen der Leberfunktion. Wenn bei Ihnen die Lebewerte im Blut überprüft werden, informieren Sie Ihren Arzt, dass Sie Sumatriptan HEXAL bei Migräne einnehmen.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)

- Brustschmerz

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Krampfanfälle (epileptische Anfälle), Zittern, Muskelkrämpfe, Steifheit des Nackens

- Sehstörungen wie Augenflimmern, Verminderung der Sehschärfe, Doppelsehen, Sehverlust und in einigen Fällen auch bleibender Sehverlust (diese Symptome können auch durch die Migräneattacke selbst ausgelöst werden)

- Herzbeschwerden, bei denen der Herzschlag sich beschleunigen, verlangsamen oder den Rhythmus ändern

kann, Schmerzen in der Brust (Angina pectoris) oder Herzinfarkt

- Blasen, blau getönte Haut und/oder Schmerzen in den Fingern, Zehen, Ohren, in der Nase oder im Kiefer als Reaktion auf Kälte oder Stress (Raynaud-Syndrom)
- Ohnmachtsgefühl (der Blutdruck kann absinken)
- Schmerzen im linken Unterbauch und blutiger Durchfall (ischämische Kolitis)
- Durchfall
- Gelenkschmerzen
- Angst/Urruhe
- Übermäßiges Schwitzen
- Wenn Sie vor kurzem eine Verletzung hatten oder wenn Sie eine Entzündung haben (wie Rheuma oder eine Entzündung des Dickdarms), kann es sein, dass Sie an der Stelle der Verletzung oder der Entzündung Schmerzen verspüren oder dass sich die Schmerzen verschlimmern.
- Schluckbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: <https://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5 Wie ist Sumatriptan HEXAL bei Migräne aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behälter (Blisterpackung) und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ oder „verw. bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.bfarm.de/arzneimittellentsorgung>.

6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Sumatriptan HEXAL bei Migräne enthält

Der Wirkstoff ist: Sumatriptan.

1 Tablette enthält 70 mg Sumatriptansuccinat, entsprechend 50 mg Sumatriptan.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A) (Ph.Eur.) (1:2:0,2), mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Carmellose-Natrium (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Grapefruit-Aroma (enthält Sulfite und Menthol).

Wie Sumatriptan HEXAL bei Migräne aussieht und Inhalt der Packung

Sumatriptan HEXAL bei Migräne sind teilweise gepunktete, rosafarbene, längliche Tabletten mit beidseitiger Bruchkerbe.

Sumatriptan HEXAL bei Migräne ist in Packungen mit 2 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Hexal AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Telefon: (08024) 908-0

Telefax: (08024) 908-1290

E-Mail: service@hexal.com

Hersteller

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2025.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung!