

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

## **GEBRAUCHSINFORMATION: Information für Anwender**

### **Myko Cordes® Plus**

10 mg/150 mg pro g

Paste zur Anwendung auf der Haut

Für Kinder und Erwachsene

Wirkstoffe: Clotrimazol; Zinkoxid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Myko Cordes Plus und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Myko Cordes Plus beachten?
3. Wie ist Myko Cordes Plus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Myko Cordes Plus aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist Myko Cordes Plus und wofür wird es angewendet?**

Myko Cordes Plus enthält als Wirkstoffe Clotrimazol und Zinkoxid. Es handelt sich um ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen (Breitspektrum-Antimykotikum).

Myko Cordes Plus ist geeignet zur Behandlung von Pilzkrankungen der Haut (Dermatomykosen), verursacht durch Hefen, Schimmelpilze und spezielle Hautpilze (Dermatophyten), insbesondere zur Behandlung von Pilzkrankungen im Bereich der Hautfalten (zwischen den Zehen, in der Leistenbeuge u. a.) und im Windelbereich (Windeldermatitis).

## **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Myko Cordes Plus beachten?**

### **Myko Cordes Plus darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Clotrimazol, Zinkoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht im 1. - 3. Schwangerschaftsmonat angewendet werden.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Myko Cordes Plus anwenden.

### **Anwendung von Myko Cordes Plus zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Der Wirkstoff Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyantibiotika (Nystatin, Natamycin).

### **Anwendung von Myko Cordes Plus zusammen mit Kosmetika**

Auf den erkrankten Hautstellen sollten Sie Desodorantien oder andere Kosmetika nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, da eine Minderung der Wirksamkeit von Myko Cordes Plus nicht ausgeschlossen werden kann.

### **Hinweis**

Bei der Behandlung mit Myko Cordes Plus im Genital- oder Analbereich kann es wegen der als Hilfsstoffe enthaltenen Fette und Emulgatoren bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Umfangreiche epidemiologische Untersuchungen, die ein Fehlbildungsrisiko für den Menschen mit einiger Sicherheit bei topischer Anwendung (dermal, vaginal) ausschließen, liegen für Clotrimazol nicht vor.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Myko Cordes Plus enthält Cetylstearylalkohol**

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

### **3. Wie ist Myko Cordes Plus anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Reinigen Sie vor und nach jeder Behandlung gründlich Ihre Hände.

Reinigen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich mit lauwarmem Wasser.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die zu behandelnde Haut völlig abtrocknet - dieses ist besonders wichtig, wenn Hautfalten betroffen sind.

Tragen Sie Myko Cordes Plus anschließend dünn und gleichmäßig auf, so dass der gesamte befallene Hautbereich mit der Paste bedeckt ist.

Zur Anwendung auf der Haut.

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach Art und Schwere des Krankheitsbildes sowie nach der Hautreaktion.

Soweit von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, wird zur Behandlung einer Pilzerkrankung, besonders im Bereich der Hautfalten, die Paste 2-mal täglich, morgens und abends, auf die befallenen Hautpartien aufgetragen.

Für den Erfolg der Anwendung ist eine regelmäßige, sorgfältige und ausreichend lange Anwendung erforderlich. Diese beträgt in der Regel zwei Wochen. Auch nach Abklingen der akuten Entzündungen und der subjektiven Beschwerden sollte einige Zeit weiter behandelt werden.

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Im Windelbereich wird die Paste bei jedem Windelwechsel dünn aufgetragen.

Ansonsten gelten bei Kindern und Jugendlichen die gleichen Dosierungsempfehlungen wie bei Erwachsenen.

#### **Kinder und ältere Menschen**

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig, da bei Anwendung von Myko Cordes Plus keine vermehrten oder verstärkten Nebenwirkungen bekannt geworden sind.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Myko Cordes Plus angewendet haben, als Sie sollten**

Die Wirkstoffe Clotrimazol und Zinkoxid sind gut verträglich.

Bei vermehrter Anwendung können Hautreizungen auftreten, spezielle Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Myko Cordes Plus vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Myko Cordes Plus abbrechen**

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise, da der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

*Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen*

In seltenen Fällen können vorübergehende Hautreizungen wie Brennen, Juckreiz oder Rötung auftreten.

Bei Überempfindlichkeit gegen Phenoxyethanol und/oder Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Myko Cordes Plus aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch ist das Arzneimittel 18 Monate verwendbar, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus.

Nicht über 30 °C lagern.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Myko Cordes Plus enthält**

Die Wirkstoffe sind Clotrimazol und Zinkoxid.

1 g Paste enthält 10 mg Clotrimazol und 150 mg Zinkoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Octyldodecanol, Cetylstearylalkohol,  $\alpha$ -Cetylstearyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylen)-12, Ceto-macrogol 1000, weißes Vaseline, Maisstärke, gereinigtes Wasser, Phenoxyethanol (Konservierungsmittel)

##### **Wie Myko Cordes Plus aussieht und Inhalt der Packung**

Myko Cordes Plus ist eine weiße Paste.

Myko Cordes Plus ist in Aluminiumtuben mit 25 g (N1) und 50 g (N2) erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG

Sportallee 85

22335 Hamburg

Tel.: 040-50714-0

Fax: 040-50714-110

E-Mail: [info@ichthyol.de](mailto:info@ichthyol.de)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im Juli 2025 überarbeitet.

---

**Haben Sie Fragen zum Arzneimittel?**

Unter den oben genannten Kontaktdaten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.