


Mundgel aldiamed

Speichelerganzung



Bitte Gebrauchsinformation aufmerksam lesen

Anwendungsgebiet

aldiamed Mundgel ist ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsgel zur Behandlung bei Mundtrockenheit (Xerostomia).

Wirkweise

aldiamed Mundgel verleiht eine fur Stunden andauernde, **angenehme Befeuchtung** im Mund. Dadurch **beugt es Reizungen und Entzundungen im Mundraum vor** und unterstutzt den naturlichen Schutz in der Mundhohle.

Die angenehm dickflussige Konsistenz sorgt dafur, dass sich das Mundgel lang anhaltend wie ein Schutzfilm auf die Mundschleimhaut legt und diese **auch nachts sehr gut vor dem Austrocknen schutzt**.

Ursachen der Mundtrockenheit

Die Intensitat der Speichelproduktion ist von Mensch zu Mensch verschieden ausgepragt und nimmt mit zunehmendem Alter meist ab.

Sie ist Schwankungen unterworfen, die z. B. auf einen starken Flussigkeitsmangel zuruckzufuhren sind (ungenugendes Trinken). Zudem kann der Speichel durch Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder

Sjogren-Syndrom, Strahlentherapien, Medikamenteneinnahme, verminderte Kautatigkeit, Stress, psychische Probleme, Rauchen sowie Mundatmung (bei Erkaltung oder Schnarchen) verringert sein.

Die Rolle des Speichels

Der Speichel des Menschen erfullt zahlreiche wichtige Funktionen. So befeuchtet er zunachst die Mundhohle, wodurch Sprechen, Kauen und Schlucken erst moglich werden. Weiterhin schutzen die im Speichel enthaltenen Enzyme den Mundraum vor schadlichen Bakterien. Wird nicht genugend Speichel produziert konnen Entzundungen in der Mundhohle, schlechter Atem und Zahnprobleme entstehen.

Anwendung

- so oft wie erforderlich
- nach dem Zahneputzen
- nach dem Mundspulen, z. B. mit der aldiamed Mundspulung
- und ganz besonders abends vor dem Zubettgehen

Sie konnen aldiamed Mundgel mit einem sauberen Finger oder einem Wattestabchen unmittelbar auf das Zahnfleisch oder die besonders trockenen Bereiche im Mund auftragen.

Um Ihre Mundhöhle komplett zu benetzen, können Sie auch 1 - 2 cm aldiamed Mundgel auf die Zunge legen und gleichmäßig mit der Zunge im Mundraum verteilen.

Hinweise

Der Zeitraum der Befeuchtung hängt von subjektiven Faktoren ab. Geringer Restspeichelfluss kann genau wie Essen, Trinken, Kaugummi kauen oder Zähneputzen das Gel schneller aus dem Mund spülen. Für eine langanhaltende Wirkung empfehlen wir, das Gel nach dem Essen und Trinken aufzutragen.

aldiamed Mundgel ist auch für Diabetiker und für Träger von Zahnprothesen geeignet.

Wirkstoffe: Glycerin, Sorbitol, Wasser, Glycerylpolyacrylat, Xanthan

Hilfsstoffe: Xylitol, Aloe vera, Lactoferrin, Lysozym

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf versehrter Mundschleimhaut anwenden.

Neben-/Wechselwirkungen: aldiamed Mundgel ist im Allgemeinen ein sehr gut verträgliches Produkt. Bei Überdosierung (mehr als eine 50-g-Tube täglich) ist eine abführende Wirkung möglich.

Weitere aldiamed-Produkte

Gerade bei Mundtrockenheit ist eine gute Mundhygiene besonders wichtig. Dazu gehört auch die regelmäßige Anwendung einer Mundspülung. Bei trockene-

nem Mund sollte diese die empfindliche Mundschleimhaut nicht zusätzlich reizen.

Daher hat die **aldiamed Mundspülung** eine milde Rezeptur und enthält keinen Alkohol. Sie reinigt und schützt Zähne und Mundschleimhaut sehr gut. Dank der leicht dickflüssigen Konsistenz befeuchtet sie den Mundraum auch kurzfristig.

Zur Befeuchtung des trockenen Mundes für unterwegs und zwischendurch empfehlen wir **aldiamed Mundspray**.

Packungsgrößen aldiamed-Produkte

Mundgel: 50 g
PZN (D): 00879268
PZN (AT): 3888517



Mundspülung: 250 ml
PZN (D): 00879239
PZN (AT): 3888523



Mundspray: 50 ml
PZN (D): 09397022
PZN (AT): 3887021



 Certmedica International GmbH
Magnolienweg 17, 63741 Aschaffenburg

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Tel.: +49 60 21 / 15 09 3 - 380

www.aldiamed.de

Stand der Information: 2018-05



 Verfallsdatum beachten



 Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

