



Wirkstoff: Magnesiumperoxid

Zusammensetzung: 100 g Pulver enthalten 100 g Magnesiumperoxid.

Darreichungsform und Inhalt: 100 g Pulver zum Einnehmen nach Suspension in Wasser oder Saft.

Hersteller: HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 1, D-23562 Lübeck.

Vertrieb und Information: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen.

Zweckbestimmung: Spezifisches Mittel bei Stuhlverstopfung und Blähungen.

Hinweis: Bei neu auftretenden Bauchbeschwerden und/oder länger anhaltenden Beschwerden sollten diese durch einen Arzt medizinisch abgeklärt werden.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei eingeschränkter Nierenfunktion und Darmverschluss (Ileus).

Nicht anwenden bei bekannter Hypersensitivität gegen Magnesiumperoxid.

Nur für Erwachsene. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen.

Verwendung in Schwangerschaft und Stillzeit: Bisher sind keine Risiken im empfohlenen Dosisbereich bekannt geworden. Wir empfehlen aus prinzipiellen Erwägungen in Schwangerschaft und Stillzeit eine Anwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der Aufnahme sollte generell ein Abstand von 1–2 Stunden zwischen der Einnahme von OZOVIT® MP und folgenden Arzneimitteln eingehalten werden: Eisen, Tetracycline, Natriumfluorid, Isoniazid, Chlorpromazin und Digoxin.

Wie bei anderen Laxantien kann es bei längerer Einnahme von OZOVIT® MP zu erhöhten Verlusten von Wasser, Kalium und anderen Salzen kommen. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen. Daher ist die Dauer der Anwendung auf eine Woche begrenzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2 mal täglich 1 bis 3 Messlöffel Pulver in Wasser oder Saft ca. 1 Stunde nach den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Auftreten stärkerer Durchfälle (wässrig-schleimig mit krampfartigen Schmerzen) Dosis verringern bzw. das Präparat einige Tage absetzen, sodann mit geringerer Dosis beginnen.

OZOVIT® MP sollte nicht länger als eine Woche angewendet werden.

Nebenwirkungen: Vereinzelt wurden stärkerer Durchfall mit Darmkrämpfen und Elektrolytverlust beobachtet, die durch eine Reduzierung der Dosis behoben werden können.

Sollten bisher unbekannte Nebenwirkungen auftreten, teilen Sie dies bitte ihrem Arzt oder Apotheker mit.



PASCOE
NATURMEDIZIN

pharmazeutische Präparate GmbH · D-35394 Giessen

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes: Nicht über 25°C lagern.
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Hinweis zur Verpackung: In Abhängigkeit von Lagerzeit und -temperatur kann es zu einer geringen Freisetzung von Sauerstoff aus OZOVIT® MP kommen. Um einen Druckausgleich zu ermöglichen, werden daher bei der Herstellung in die Schlauchverpackung zwei kleine Löcher gestanzt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:			
			
Chargen- bezeichnung	Verwendbar bis: Monat/Jahr	Gebrauchsanweisung beachten!	Obere Temperatur- begrenzung

C € 0482



PASCOE
NATURMEDIZIN

pharmazeutische Präparate GmbH · D-35394 Giessen

10868-DE-002